

**Zadatak 001 (Sanja, gimnazija)**

Odredi realnu funkciju  $f(x)$  ako je

$$f\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^2 + \frac{1}{x^2}.$$

**Rješenje 001**

Uvedemo supstituciju (zamjenu varijabli)

$$x + \frac{1}{x} = t$$

Kvadriramo:

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = t^2 \Rightarrow x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = t^2 \Rightarrow x^2 + 2 + \frac{1}{x^2} = t^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x^2 + \frac{1}{x^2} = t^2 - 2.$$

Uvrstimo novu varijablu u funkciju:  $f(t) = t^2 - 2$ .

Dobili smo traženu funkciju

$$f(x) = x^2 - 2.$$

**Vježba 001**

Odredi realnu funkciju  $f(x)$  ako je  $f(x + 1) = x + 2$ .

**Rezultat:**  $f(x) = x + 1$ .

**Zadatak 002 (Sanja, gimnazija)**

Odredi inverznu funkciju  $f^{-1}(x)$  ako je

$$f(x) = \frac{3^x + 2}{3^x + 1}.$$

**Rješenje 002**

Napišimo zadanu funkciju tako da umjesto  $f(x)$  pišemo  $y$ :

$$y = \frac{3^x + 2}{3^x + 1}.$$

Sada u funkciji zamjenimo slova  $x$  i  $y$ :

$$x \leftrightarrow y,$$

$$x = \frac{3^y + 2}{3^y + 1}.$$

Iz dobivene funkcije trebamo izračunati nepoznanicu  $y$ . Prvo ćemo cijelu jednadžbu pomnožiti zajedničkim nazivnikom  $3^y + 1$ :

$$x = \frac{3^y + 2}{3^y + 1} / \cdot (3^y + 1) \Rightarrow x \cdot (3^y + 1) = 3^y + 2 \Rightarrow$$

[ $x$  množi cijelu zagradu]

$$\Rightarrow x \cdot 3^y + x = 3^y + 2 \Rightarrow$$

[na lijevu stranu prebacimo nepoznanicu  $y$ ]

$$\Rightarrow x \cdot 3^y - 3^y = 2 - x \Rightarrow$$

[izlučimo  $3^y$ ]

$$\Rightarrow 3^y \cdot (x - 1) = 2 - x / : (x - 1) \Rightarrow 3^y = \frac{2 - x}{x - 1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow [jednadžbu logaritmiramo logaritmom po bazi 3] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 3^y = \frac{2-x}{x-1} / \log_3 \Rightarrow \log_3 3^y = \log_3 \frac{2-x}{x-1} \Rightarrow [\log_b a^n = n \cdot \log_b a, \log_b b = 1] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y \cdot \log_3 3 = \log_3 \frac{2-x}{x-1} \Rightarrow y \cdot 1 = \log_3 \frac{2-x}{x-1} \Rightarrow y = \log_3 \frac{2-x}{x-1}.$$

Na kraju ponovno umjesto  $y$  napišemo  $f^{-1}(x)$  pa rješenje glasi:

$$f^{-1}(x) = \log_3 \frac{2-x}{x-1}.$$

### Vježba 002

Odredi inverznu funkciju  $f^{-1}(x)$  ako je

$$f(x) = \frac{2^x + 3}{2^x + 5}.$$

**Rezultat:**  $f^{-1}(x) = \log_2 \frac{3-5x}{x-1}$ .

### Zadatak 003 (Mira, gimnazija)

Nacrtaj graf funkcije

$$f(x) = 2\sin(2x - \pi).$$

### Rješenje 003

Podsjetimo se svojstava funkcije  $f(x) = \sin x$ :

- Period funkcije sinus je  $2\pi$ .
- Nultočke (točke u kojima graf siječe x-os ili apscisu) su  $0, \pi, 2\pi, 3\pi, \dots$ , tj.  $k\pi$ ,  $k$  je cijeli broj. Mi ćemo samo promatrati dio grafa na segmentu  $[0, 2\pi]$ .
- Maksimum funkcije je u


$$\frac{\pi}{2}$$

i iznosi  $+1$ .

- Minimum funkcije je u

$$\frac{3\pi}{2}$$

i iznosi  $-1$ .



Zadana funkcija  $f(x) = 2\sin(2x - \pi)$  ima amplitudu 2 što znači da će maksimum biti  $+2$ , a minimum  $-2$ .

Nultočke funkcije nađemo tako da vrijednost argumenta  $2x - \pi$  izjednačimo s nultočkama funkcije sinus:  $0, \pi, 2\pi$ .

$$2x - \pi = 0 \Rightarrow 2x = \pi / :2 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2},$$

$$2x - \pi = \pi \Rightarrow 2x = \pi + \pi \Rightarrow 2x = 2\pi / :2 \Rightarrow x = \pi,$$

$$2x - \pi = 2\pi \Rightarrow 2x = 2\pi + \pi \Rightarrow 2x = 3\pi / :2 \Rightarrow x = \frac{3\pi}{2}.$$

Nultočke naše funkcije su:

$$\frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}.$$

Funkcija sinus imala je maksimum u točki

$$\frac{\pi}{2}.$$

Sada argument  $2x - \pi$  zadane funkcije izjednačimo s

$$\frac{\pi}{2}$$

pa je

$$2x - \pi = \frac{\pi}{2} \Rightarrow 2x = \frac{\pi}{2} + \pi \Rightarrow 2x = \frac{3\pi}{2} / :2 \Rightarrow x = \frac{3\pi}{4}.$$

Dakle, funkcija  $f(x) = 2\sin(2x - \pi)$  ima maksimum u

$$\frac{3\pi}{4}$$

koji iznosi +2.


Analogno je za minimum:

$$2x - \pi = \frac{3\pi}{2} \Rightarrow 2x = \frac{3\pi}{2} + \pi \Rightarrow 2x = \frac{5\pi}{2} / :2 \Rightarrow x = \frac{5\pi}{4}.$$

Dakle, funkcija  $f(x) = 2\sin(2x - \pi)$  ima minimum u

$$\frac{5\pi}{4}$$

koji iznosi -2.




### Vježba 003

Nacrtaj graf funkcije

$$f(x) = -2\sin(2x - \pi).$$

### Rezultat:



### Zadatak 004 (Mira, gimnazija)

Nacrtaj graf funkcije

$$f(x) = 2\cos(2x - \pi).$$

### Rješenje 004


Podsjetimo se svojstava funkcije  $f(x) = \cos x$ :

- Period funkcije kosinus je  $2\pi$ .
- Nultočke (točke u kojima graf siječe x-os ili apscisu) su

$$\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \dots, \text{tj. } (2k-1) \cdot \frac{\pi}{2}, \text{ k je cijeli broj}$$

Mi ćemo samo promatrati dio grafa na segmentu  $[0, 2\pi]$ .

- Maksimum funkcije je u 0 i  $2\pi$  i iznosi +1.
- Minimum funkcije je u  $\pi$  i iznosi -1.



Zadana funkcija  $f(x) = 2\cos(2x - \pi)$  ima amplitudu 2 što znači da će maksimum biti +2, a minimum -2.

Nultočke funkcije nađemo tako da vrijednost argumenta  $2x - \pi$  izjednačimo s nultočkama funkcije kosinus:

$$\frac{\pi}{2} \text{ i } \frac{3\pi}{2}.$$

$$2x - \pi = \frac{\pi}{2} \Rightarrow 2x = \frac{\pi}{2} + \pi \Rightarrow 2x = \frac{3\pi}{2} /:2 \Rightarrow x = \frac{3\pi}{4},$$

$$2x - \pi = \frac{3\pi}{2} \Rightarrow 2x = \frac{3\pi}{2} + \pi \Rightarrow 2x = \frac{5\pi}{2} /:2 \Rightarrow x = \frac{5\pi}{4}.$$

Nultočke naše funkcije su:

$$\frac{3\pi}{4} \text{ i } \frac{5\pi}{4}.$$

Funkcija kosinus imala je maksimum u točkama 0 i  $2\pi$ . Sada argument  $2x - \pi$  zadane funkcije izjednačimo s 0 i  $2\pi$ :

$$2x - \pi = 0 \Rightarrow 2x = \pi /:2 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2},$$

$$2x - \pi = 2\pi \Rightarrow 2x = 2\pi + \pi \Rightarrow 2x = 3\pi /:2 \Rightarrow x = \frac{3\pi}{2}.$$

Dakle, funkcija  $f(x) = 2\cos(2x - \pi)$  ima maksimume u


$$\frac{\pi}{2} \text{ i } \frac{3\pi}{2}$$

koji iznose +2.

Analogno je za minimum:

$$2x - \pi = \pi \Rightarrow 2x = \pi + \pi \Rightarrow 2x = 2\pi /:2 \Rightarrow x = \pi.$$


Dakle, funkcija  $f(x) = 2\cos(2x - \pi)$  ima minimum u  $\pi$  koji iznosi -2.



#### Vježba 004

Nacrtaj graf funkcije :  $f(x) = -2\cos(2x - \pi)$ .

#### Rezultat:



### Zadatak 005 (Petra, gimnazija)

Odredi temeljni period funkcije:  $f(x) = \sin x \cdot \sin 3x$ .

#### Rješenje 005

Funkcija  $f$  je periodička s periodom  $P$  ( $P \neq 0$ ), ako za svaki  $x$  vrijedi: Ako je funkcija  $f$  definirana u jednoj od točaka  $x, x + P$ , onda je definirana u obje te točke i vrijedi

$$f(x + P) = f(x).$$

Broj  $P$  zove se period funkcije  $f$ . Najmanji pozitivni period funkcije  $f$  (ako postoji) zove se **temeljni period** funkcije  $f$ .

Ako je  $P$  period zadane funkcije, onda mora vrijediti:

$$\sin(x + P) \cdot \sin 3(x + P) = \sin x \cdot \sin 3x.$$

Ova jednakost vrijedi za svaki  $x$  pa specijalno za  $x = 0$  dobivamo:

$$\sin(0 + P) \cdot \sin 3(0 + P) = \sin 0 \cdot \sin(3 \cdot 0),$$

$$[\sin 0 = 0]$$

$$\sin P \cdot \sin 3P = 0.$$

Produkt dva broja jednak je nuli ako je barem jedan od brojeva jednak nuli.

Zato pišemo:

$$\sin P = 0, \sin 3P = 0.$$

Jednadžba  $\sin P = 0$  daje rješenja  $P_1 = k\pi$ . Jednadžba  $\sin 3P = 0$  daje rješenja

$$P_2 = \frac{k \cdot \pi}{3}.$$

Broj  $k$  je prirodan broj. Provjeravanjem za

$$P = \frac{\pi}{3} \text{ i } P = \frac{2\pi}{3}$$

vidimo da nisu periodi. Temeljni period zadane funkcije je  $P = \pi$ .

### Vježba 005

Odredi temeljni period funkcije:  $f(x) = \cos 2x$ .

**Rezultat:**  $P = \pi$ .

### Zadatak 006 (Martina, gimnazija)

Nacrtaj graf funkcije

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 - 1}.$$

#### Rješenje 006

Crtanje grafa funkcije pokazat ćemo kroz sve faze.

##### I. DOMENA FUNKCIJE

Moramo naći vrijednosti  $x$  za koje funkcija  $f(x)$  nije definirana i njih izbaciti iz skupa  $\mathbf{R}$ . Budući da je to racionalna funkcija nazivnik ćemo izjednačiti s nulom i riješiti dobivenu jednadžbu:

$$x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x^2 = 1 \cancel{/\sqrt{}} \Rightarrow x_{1,2} = \pm\sqrt{1} \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = 1.$$

Domena je skup  $\mathbf{R}$ , osim brojeva  $-1$  i  $1$ . Pišemo:

$$D(f) = \mathbf{R} \setminus \{-1, 1\}.$$

##### II. PARNOST FUNKCIJE

Provjerimo je li zadana funkcija parna, neparna ili nije ni jedno, ni drugo.

Za parne funkcije vrijedi:  $f(-x) = f(x)$ , gdje su  $-x$  i  $x$  iz domene.

Za neparne funkcije vrijedi:  $f(-x) = -f(x)$ , gdje su  $-x$  i  $x$  iz domene.

Računamo:

$$f(-x) = \frac{(-x)^2 - 4}{(-x)^2 - 1} = \frac{x^2 - 4}{x^2 - 1} = f(x).$$

Funkcija  $f(x)$  je parna, a to znači da je njezin graf simetričan s obzirom na  $y$ -os ili ordinatu.

### III. INTERVALI MONOTONOSTI FUNKCIJE

Ako je funkcija  $f(x)$  neprekinuta na segmentu  $[a,b]$  i  $f'(x) > 0$  za  $a < x < b$ , tada je  $f(x)$  monotono rastuća (uzlazna).

Ako je funkcija  $f(x)$  neprekinuta na segmentu  $[a,b]$  i  $f'(x) < 0$  za  $a < x < b$ , tada je  $f(x)$  monotono padajuća (silazna).

Tražimo prvu derivaciju zadane funkcije:

$$f'(x) = \frac{(x^2 - 4)' \cdot (x^2 - 1) - (x^2 - 4) \cdot (x^2 - 1)'}{(x^2 - 1)^2} = \frac{2x \cdot (x^2 - 1) - (x^2 - 4) \cdot 2x}{(x^2 - 1)^2} = \frac{2x^3 - 2x - 2x^3 + 8x}{(x^2 - 1)^2} = \frac{6x}{(x^2 - 1)^2}.$$

Ako je  $f'(x) > 0$ , slijedi  $\frac{6x}{(x^2 - 1)^2} > 0$ .

Razlomak je pozitivan ako su brojnik i nazivnik oba pozitivni ili oba negativni. U našem slučaju nazivnik je na kvadrat pa je to uvijek pozitivno. Znači da i brojnik mora biti pozitivan:  $6x > 0 \Rightarrow x > 0$ . Prema tome, za  $x > 0$  funkcija je monotono rastuća.

Ako je  $f'(x) < 0$ , slijedi  $\frac{6x}{(x^2 - 1)^2} < 0$ .

Razlomak je negativan ako je brojnik negativan, a nazivnik pozitivan ili ako je brojnik pozitivan, a nazivnik negativan. U našem slučaju nazivnik je na kvadrat pa je to uvijek pozitivno. Znači da brojnik mora biti negativan:  $6x < 0 \Rightarrow x < 0$ . Prema tome, za  $x < 0$  funkcija je monotono padajuća.

### IV. NULTOČKE FUNKCIJE

Nultočke funkcije jesu točke u kojima graf funkcije siječe  $x$ -os ili apscisu. Budući da je to racionalna funkcija brojnik ćemo izjednačiti s nulom i riješiti dobivenu jednadžbu:

$$x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x^2 = 4 \sqrt{\quad} \Rightarrow x_{1,2} = \pm\sqrt{4} \Rightarrow x_1 = -2, x_2 = 2.$$

Funkcija ima dvije nultočke  $N_1(-2, 0)$  i  $N_2(2, 0)$ .

### V. EKSTREMI FUNKCIJE

Ekstremi funkcije mogu biti maksimum ili minimum ili oboje. Moramo najprije naći prvu derivaciju:

$$f'(x) = \frac{(x^2 - 4)' \cdot (x^2 - 1) - (x^2 - 4) \cdot (x^2 - 1)'}{(x^2 - 1)^2} = \frac{2x \cdot (x^2 - 1) - (x^2 - 4) \cdot 2x}{(x^2 - 1)^2} = \frac{2x^3 - 2x - 2x^3 + 8x}{(x^2 - 1)^2} = \frac{6x}{(x^2 - 1)^2}.$$

Sada prvu derivaciju izjednačimo s nulom i riješimo dobivenu jednadžbu.

$$\frac{6x}{(x^2 - 1)^2} = 0 \Rightarrow [\text{razlomak je jednak nuli, ako je brojnik jednak nuli}] \Rightarrow 6x = 0 \Rightarrow x = 0.$$

Rješenje je  $x = 0$ . Ta se točka zove stacionarna točka. Hoće li u njoj biti maksimum ili minimum, znat ćemo ako nađemo drugu derivaciju. U drugu derivaciju uvrstimo  $x = 0$ . Ako je druga derivacija pozitivna, funkcija ima minimum, ako je pak druga derivacija negativna, funkcija ima maksimum.

$$f''(x) = \frac{(6x) \cdot (x^2 - 1)^2 - 6x \cdot (x^2 - 1)^2}{(x^2 - 1)^2} = \frac{6 \cdot (x^2 - 1)^2 - 6x \cdot 2 \cdot (x^2 - 1) \cdot 2x}{(x^2 - 1)^4} = \frac{(x^2 - 1) \cdot [6 \cdot (x^2 - 1) - 24x^2]}{(x^2 - 1)^4} = \frac{6 \cdot (x^2 - 1) - 24x^2}{(x^2 - 1)^3}$$

Uvrstimo  $x = 0$ :

$$f''(0) = \frac{6 \cdot (0^2 - 1) - 24 \cdot 0^2}{(0^2 - 1)^3} = \frac{-6}{-1} = 6 > 0.$$

Dakle, druga derivacija je pozitivna pa funkcija u točki  $x = 0$  ima minimum. Vrijednost minimuma dobit ćemo tako da  $x = 0$  uvrstimo u zadatu funkciju:

$$f(0) = \frac{0^2 - 4}{0^2 - 1} = \frac{-4}{-1} = 4.$$

Minimum će biti u točki  $M(0, 4)$ .

## VI. VERTIKALNE ASIMPTOTE

Ako postoji takav broj  $a$  da je

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty,$$

onda je pravac  $x = a$  asimptota (*vertikalna asimptota*).

Budući da je to racionalna funkcija:

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 - 1}$$

nazivnik ćemo izjednačiti s nulom i riješiti dobivenu jednadžbu:

$$x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x^2 = 1 \cancel{\sqrt{}} \Rightarrow x_{1,2} = \pm\sqrt{1} \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = 1.$$

Vertikalne asimptote su pravci:  $x = -1$  i  $x = 1$ .

## VII. KOSE ASIMPTOTE

Ako postoje limesi

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x},$$

gdje je  $k$  koeficijent smjera i

$$l = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - k \cdot x],$$

gdje je  $l$  odsječak na  $y$ -osi,

tada je pravac  $y = kx + l$  asimptota (desna kosa asimptota). Ako je  $k = 0$ , onda je to desna horizontalna asimptota.

Ako postoje limesi

$$k = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x},$$

gdje je  $k$  koeficijent smjera i

$$l = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - k \cdot x],$$

gdje je  $l$  odsječak na  $y$ -osi,

tada je pravac  $y = kx + l$  asimptota (lijeva kosa asimptota). Ako je  $k = 0$ , onda je to lijeva horizontalna asimptota.

Graf funkcije  $y = f(x)$  (prepostavljamo da je funkcija jednoznačna) ne može imati više od jedne desne (kose ili horizontalne) niti više od jedne lijeve (kose ili horizontalne) asimptote.

Tražimo koeficijent smjera  $k$ .


$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\frac{x^2-4}{x^2-1}}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2-4}{x^3-x}.$$

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\frac{x^2-4}{x^2-1}}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\frac{x^2-4}{x^3-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\frac{x^2-4}{x^3}}{\frac{x^3-x}{x}} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\frac{x^2-4}{x^3}}{\frac{x^2-1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\frac{1-\frac{4}{x^2}}{1-\frac{1}{x^2}}}{1-\frac{1}{x^2}} = \frac{0-0}{1-0} = \frac{0}{1} = 0.$$

Računamo odsječak na y-osi l.

$$l = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - k \cdot x] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[ \frac{x^2-4}{x^2-1} - 0 \cdot x \right] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2-4}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\frac{x^2-4}{x^2}}{\frac{x^2-1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1-\frac{4}{x^2}}{1-\frac{1}{x^2}} = \frac{1-0}{1-0} = \frac{1}{1} = 1.$$

Asimptota je pravac  $y = 1$ .




### Vježba 006

Nacrtaj graf funkcije

$$f(x) = \frac{x^2-1}{x^2-4}.$$

**Rezultat:**



### Zadatak 007 (Darjan, medicinska škola)

Nacrtaj graf funkcije

$$f(x) = -\frac{3}{2} \cdot \cos(x + \frac{5\pi}{2}).$$

### Rješenje 007


Podsjetimo se svojstava funkcije  $f(x) = \cos x$ :

- Period funkcije kosinus je  $2\pi$ .
- Nultočke (točke u kojima graf siječe x-os ili apscisu) su

$$\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \dots, \text{tj. } (2k-1) \cdot \frac{\pi}{2}, \text{ k je cijeli broj}$$

Mi ćemo samo promatrati dio grafa na segmentu  $[0, 2\pi]$ .

- Maksimum funkcije je u 0 i  $2\pi$  i iznosi +1.
- Minimum funkcije je u  $\pi$  i iznosi -1.



Zadana funkcija

$$f(x) = -\frac{3}{2} \cdot \cos(x + \frac{5\pi}{2})$$

ima amplitudu

$$-\frac{3}{2}$$

što znači da će maksimum biti

$$\frac{3}{2},$$

a minimum

$$-\frac{3}{2}.$$

Nultočke funkcije nađemo tako da vrijednost argumenta

$$x + \frac{5\pi}{2}$$

izjednačimo s nultočkama funkcije kosinus:

$$\frac{\pi}{2} \text{ i } \frac{3\pi}{2}.$$

$$x + \frac{5\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} - \frac{5\pi}{2} \Rightarrow x = -\frac{4\pi}{2} = -2\pi,$$

$$x + \frac{5\pi}{2} = \frac{3\pi}{2} \Rightarrow x = \frac{3\pi}{2} - \frac{5\pi}{2} \Rightarrow x = -\frac{2\pi}{2} = -\pi.$$

Nultočke naše funkcije su:

$$-2\pi, -\pi.$$

Funkcija kosinus je imala maksimum u točkama 0 i  $2\pi$  (to će sada biti minimum zbog negativne amplitude). Sada argument

$$x + \frac{5\pi}{2}$$

zadane funkcije izjednačimo s 0 i  $2\pi$ :

$$x + \frac{5\pi}{2} = 0 \Rightarrow x = -\frac{5\pi}{2},$$

$$x + \frac{5\pi}{2} = 2\pi \Rightarrow x = 2\pi - \frac{5\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}.$$

Dakle, funkcija

$$f(x) = -\frac{3}{2} \cdot \cos(x + \frac{5\pi}{2})$$

ima minimum u

$$-\frac{5\pi}{2} \text{ i } -\frac{\pi}{2}$$

koji iznosi

$$-\frac{3}{2}.$$

Analogno je za maksimum:


$$x + \frac{5\pi}{2} = \pi \Rightarrow x = \pi - \frac{5\pi}{2} = -\frac{3\pi}{2}.$$

Dakle, funkcija ima maksimum u

$$-\frac{3\pi}{2}$$

koji iznosi


$$\frac{3}{2}.$$



### Vježba 007

Nacrtaj graf funkcije:  $f(x) = 2 \cdot \cos(2x)$ .

### Rezultat:



### Zadatak 008 (Ivana, gimnazija)

Odredi domenu funkcije

$$f(x) = \frac{x+3}{3x-6}.$$

### Rješenje 008

Domenu razlomljene linearne funkcije čine svi realni brojevi za koje je nazivnik različit od nule. Zato ćemo polinom u nazivniku izjednačiti s nulom, riješiti jednadžbu i rješenje "izbaciti" iz skupa R:

$$3x - 6 = 0 \Rightarrow 3x = 6 \quad / :3 \Rightarrow x = 2. \quad (\text{x} \neq 2)$$

$$D(f) = R \setminus \{2\}.$$

### Vježba 008

Odredi domenu funkcije

$$f(x) = \frac{x-2}{5x-15}.$$

$$\text{Rezultat: } D(f) = R \setminus \{3\}.$$

### Zadatak 009 (Ivana, gimnazija)

Prevedi u eksplisitni oblik:  $2x - 3xy + 4y - 5 = 0$ .

### Rješenje 009

Ako se funkcija može napisati u obliku  $y = f(x)$  kažemo da ima eksplisitni oblik. Iz zadane jednadžbe izračunamo y:

$$2x - 3xy + 4y - 5 = 0 \Rightarrow -3xy + 4y = -2x + 5 \quad / \cdot (-1) \Rightarrow 3xy - 4y = 2x - 5 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y \cdot (3x - 4) = 2x - 5 \quad /:(3x - 4) \Rightarrow \\ \Rightarrow y = \frac{2x - 5}{3x - 4}.$$

### Vježba 009

Prevedi u eksplicitni oblik:  $5x - 2xy + 7y - 3 = 0$ .

**Rezultat:**  $y = \frac{5x - 3}{2x - 7}$ .

### Zadatak 010 (Ivana, gimnazija)

Odredi domenu funkcije:

$$f(x) = \frac{\log(2x - 3)}{3x - x^2}.$$

### Rješenje 010

Domena logaritamske funkcije  $y = \log x$  skup je svih pozitivnih realnih brojeva:

$$D(\log x) = \langle 0, +\infty \rangle.$$

Budući da je u brojniku logaritamska funkcija, bit će:

$$2x - 3 > 0,$$

$$2x > 3 \quad /:2$$

$$x > \frac{3}{2}.$$

Znači da je domena funkcije  $\log(2x - 3)$  interval:

$$\left\langle \frac{3}{2}, +\infty \right\rangle.$$

U nazivniku je polinom drugog stupnja. Nazivnik ne smije biti jednak nuli ni za koji  $x$  (jer se s nulom ne može dijeliti). Zato izraz u nazivniku izjednačimo s nulom, riješimo jednadžbu i rezultate "izbacimo" iz skupa  $\mathbb{R}$ :

$$\begin{aligned} 3x - x^2 &= 0 \Rightarrow x \cdot (3 - x) = 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow [a \cdot b = 0 \Leftrightarrow a = 0 \text{ ili } b = 0 \text{ ili } a = b = 0] &\Rightarrow \\ \Rightarrow x = 0 \quad , \quad 3 - x = 0 &\Rightarrow x_1 = 0 \quad , \quad x_2 = 3. \quad (x_1 \neq 0 \quad , \quad x_2 \neq 3) \end{aligned}$$

Domena zadane funkcije je:

$$D(f) = \left\langle \frac{3}{2}, +\infty \right\rangle \setminus \{3\}$$

ili

$$D(f) = \left\langle \frac{3}{2}, 3 \right\rangle \cup \langle 3, +\infty \rangle.$$

### Vježba 010

Odredi domenu funkcije:

$$f(x) = \frac{\log(2x - 6)}{7x - x^2}.$$

**Rezultat:**  $\langle 3, +\infty \rangle \setminus \{7\}$ .

### Zadatak 011 (Tonka, ekonomска škola)

Za funkcije  $f(x) = x^2 - 5x + 2$  i  $g(x) = 4x + 1$  odredite  $f \circ g$ .

### Rješenje 011

Funkcija  $f$  zadana je analitičkim izrazom pa vrijedi:

$$f(x) = x^2 - 5x + 2,$$

$$f(a) = a^2 - 5a + 2 \quad , \quad f(-b) = (-b)^2 - 5 \cdot (-b) + 2 \quad , \quad f(a+b) = (a+b)^2 - 5 \cdot (a+b) + 2,$$

$$f(ab+c) = (ab+c)^2 - 5 \cdot (ab+c) + 2 \quad , \quad f\left(\frac{a}{b}\right) = \left(\frac{a}{b}\right)^2 - 5 \cdot \frac{a}{b} + 2,$$

Slično je i za funkciju g:

$$g(x) = 4x + 1 \quad , \quad g(a) = 4a + 1 \quad , \quad g(-b) = 4 \cdot (-b) + 1 \quad , \quad g(a+b) = 4 \cdot (a+b) + 1,$$

$$g(ab+c) = 4 \cdot (ab+c) + 1 \quad , \quad g\left(\frac{a}{b}\right) = 4 \cdot \frac{a}{b} + 1.$$

Kompozicija funkcija  $f \circ g$  tada je jednaka:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(4x+1) = (4x+1)^2 - 5 \cdot (4x+1) + 2 = 16x^2 + 8x + 1 - 20x - 5 + 2 = 16x^2 - 12x - 2.$$

Možemo računati i ovako:

$$\begin{aligned} (f \circ g)(x) &= f(g(x)) = [g(x)]^2 - 5 \cdot g(x) + 2 = [4x+1]^2 - 5 \cdot (4x+1) + 2 = 16x^2 + 8x + 1 - 20x - 5 + 2 = \\ &= 16x^2 - 12x - 2. \end{aligned}$$

### Vježba 011

Za funkcije  $f(x) = x^2 + 2x + 1$  i  $g(x) = x - 1$  odredite  $f \circ g$ .

**Rezultat:**  $x^2$ .

### Zadatak 012 (Ines, gimnazija)

Koliki je zbroj nultočaka funkcije

$$f(x) = x^4 - \frac{1}{2}x^3 - 3x^2 - \frac{1}{2}x + 1?$$

### Rješenje 012

Budući da je to polinom četvrtog stupnja, bit će četiri nultočke. Najjednostavnije do rješenja dođemo uporabom Vièteovih formula:

Neka je  $f(x) = x^n + a_1 \cdot x^{n-1} + a_2 \cdot x^{n-2} + a_3 \cdot x^{n-3} + \dots + a_{n-2} \cdot x^2 + a_{n-1} \cdot x + a_n$  polinom, a  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$  njegove nultočke. Tada vrijede Vièteove formule:

$$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n = -a_1$$

$$x_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_3 + x_1 \cdot x_4 + \dots + x_1 \cdot x_n + x_2 \cdot x_3 + x_2 \cdot x_4 + \dots + x_{n-1} \cdot x_n = a_2$$

$$x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 + x_1 \cdot x_2 \cdot x_4 + \dots + x_{n-2} \cdot x_{n-1} \cdot x_n = -a_3$$

...

$$x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot \dots \cdot x_n = (-1)^n \cdot a_n$$

Ako polinom  $f(x)$  nije normiran, tj. ako mu je najstariji koeficijent  $a_0 \neq 1$ , onda na desnim stranama umjesto  $a_i$  treba pisati  $\frac{a_i}{a_0}$ . Za polinom četvrtog stupnja

$$f(x) = x^4 + a_1 \cdot x^3 + a_2 \cdot x^2 + a_3 \cdot x + a_4$$

Vièteove formule glase:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -a_1$$

$$x_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_3 + x_1 \cdot x_4 + x_2 \cdot x_3 + x_2 \cdot x_4 + x_3 \cdot x_4 = a_2$$

$$x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 + x_1 \cdot x_2 \cdot x_4 + x_1 \cdot x_3 \cdot x_4 + x_2 \cdot x_3 \cdot x_4 = -a_3$$

$$x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot x_4 = a_4.$$

U našem zadatku

$$f(x) = x^4 - \frac{1}{2}x^3 - 3x^2 - \frac{1}{2}x + 1$$

koeficijenti su

$$a_1 = -\frac{1}{2}, \quad a_2 = -3, \quad a_3 = -\frac{1}{2}, \quad a_4 = 1$$

pa je

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -a_1 = -\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}.$$

Zbroj nultočaka jednak je  $\frac{1}{2}$ .

### Vježba 012

Koliki je zbroj nultočaka funkcije:  $f(x) = x^4 + 6x^3 + 2x^2 - 5x + 8$ ?

**Rezultat:**  $-6$ .

### Zadatak 013 (Ines, gimnazija)

Ako je  $x = 2$  nultočka polinoma  $f(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 4$ , odredi njezinu kratnost.

### Rješenje 013

Uvjerimo se da je  $x = 2$  nultočka zadanog polinoma  $f(x)$ :

$$\begin{aligned} f(x) &= x^3 - 5x^2 + 8x - 4, \\ f(2) &= 2^3 - 5 \cdot 2^2 + 8 \cdot 2 - 4 = 8 - 20 + 16 - 4 = 24 - 24 = 0. \end{aligned}$$

Dobili smo  $f(2) = 0$ , što znači da je  $x = 2$  nultočka polinoma  $f(x)$ .

Polinom  $f(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 4$  može se napisati kao  $f(x) = (x - x_1) \cdot (x - x_2) \cdot (x - x_3)$ , gdje su  $x_1, x_2, x_3$  nultočke zadanog polinoma. Pišemo:

$$x^3 - 5x^2 + 8x - 4 = (x - 2) \cdot (x - x_2) \cdot (x - x_3).$$

Sada polinom  $f(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 4$  podijelimo polinomom  $x - 2$ . [Kako se dijele polinomi pogledajte [\[Zadatak 001 i Zadatak 004\]](#)]

$$(x^3 - 5x^2 + 8x - 4) : (x - 2) = x^2 - 3x + 2$$

$$\pm x^3 \mp 2x^2$$

$$\underline{-3x^2 + 8x}$$

$$\mp 3x^2 \pm 6x$$

$$\underline{2x - 4}$$

$$\pm 2x \mp 4$$

$$\underline{0}$$

Do polinoma  $x^2 - 3x + 2$  možemo doći i na sljedeći način [uporabom teorema o jednakosti dva polinoma]:

**Dva polinoma su jednaka ako i samo ako su istog stupnja i ako su im koeficijenti uz iste potencije jednaki.]**

Napišimo:

$$x^3 - 5x^2 + 8x - 4 = (x - 2) \cdot (x^2 + ax + b),$$

$$x^3 - 5x^2 + 8x - 4 = x^3 + ax^2 + bx - 2x^2 - 2ax - 2b,$$

$$x^3 - 5x^2 + 8x - 4 = x^3 + (a - 2)x^2 + (b - 2a)x - 2b,$$

$$\left. \begin{array}{l} a-2=-5 \\ b-2a=8 \\ -2b=-4 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} a=-3 \\ b=2 \end{array} \right\}.$$

Dakle polinom glasi

$$x^2 + ax + b = x^2 - 3x + 2.$$

Nađimo nultočke polinoma  $f(x) = x^2 - 3x + 2$ .

$$x^2 - 3x + 2 = 0,$$

$$x_{2,3} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{3 \pm \sqrt{9-8}}{2} = \frac{3 \pm 1}{2} \Rightarrow x_2 = \frac{3+1}{2} = 2, \quad x_3 = \frac{3-1}{2} = 1.$$

Ponovno je broj 2 nultočka. Dakle,  $x = 2$  je nultočka kratnosti 2.

### Vježba 013

Ako je  $x = 1$  nultočka polinoma  $f(x) = x^3 - x^2 - x + 1$ , odredi njezinu kratnost.

**Rezultat:** 2.

### Zadatak 014 (Matea, gimnazija)

Racionalnu funkciju  $h$  prikaži kao linearu kombinaciju racionalnih funkcija  $f$  i  $g$  ako je zadano:

$$h(x) = \frac{x}{x^2 - 1}, \quad f(x) = \frac{1}{x-1}, \quad g(x) = \frac{1}{x+1}.$$

### Rješenje 014

#### Teorija:

Za zadane funkcije  $f$  i  $g$  i realne brojeve  $A$  i  $B$  funkcija  $h = A \cdot f + B \cdot g$ , zove se **linearna kombinacija** funkcija  $f$  i  $g$ . Realne brojeve  $A$  i  $B$  odredit ćemo **metodom neodređenih koeficijenata**.

Prema uvjetu zadatka treba odrediti realne brojeve  $A$  i  $B$  takve da vrijedi

$$\begin{aligned} h(x) &= A \cdot f(x) + B \cdot g(x), \\ \frac{x}{x^2 - 1} &= \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1}. \end{aligned}$$

Pomnožimo ovu jednakost izrazom  $x^2 - 1$ :

$$\frac{x}{x^2 - 1} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} \quad / \cdot (x^2 - 1) \Rightarrow x = A \cdot (x+1) + B \cdot (x-1).$$

Sređivanjem desne strane jednakosti dobije se:

$$x = Ax + A + Bx - B,$$

$$x = (A+B) \cdot x + (A-B).$$

Prema stavku o jednakosti polinoma

**[Dva polinoma su jednaka ako i samo ako su istog stupnja i ako su im koeficijenti uz iste potencije jednaki.]**

mora vrijediti:

$$x = (A+B) \cdot x + (A-B) \Rightarrow 1 \cdot x + 0 = (A+B) \cdot x + (A-B) \Rightarrow \left. \begin{array}{l} A+B=1 \\ A-B=0 \end{array} \right\} \Rightarrow 2A=1 \Rightarrow A=\frac{1}{2} \Rightarrow B=\frac{1}{2}.$$

Traženi rastav glasi:

$$\frac{x}{x^2 - 1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x-1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x+1}, \quad \text{tj.} \quad h = \frac{1}{2} \cdot f + \frac{1}{2} \cdot g.$$

### Vježba 014

Racionalnu funkciju  $h$  prikaži kao linearu kombinaciju racionalnih funkcija  $f$  i  $g$  ako je zadano:

$$h(x) = \frac{1}{x^2 - 1}, \quad f(x) = \frac{1}{x-1}, \quad g(x) = \frac{1}{x+1}.$$

**Rezultat:**  $h = \frac{1}{2} \cdot f - \frac{1}{2} \cdot g.$

**Zadatak 015 (Ines, gimnazija)**

Odredite područje definicije realne funkcije  $f(x) = \sqrt{\frac{10-\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}}}.$

**Rješenje 015**

Ponovimo!

Područje definicije funkcije  $f(x) = \sqrt{x}$  je  $x \geq 0$  ili  $x \in [0, +\infty).$

Zato je:

$$\frac{10-\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}} \geq 0.$$

Uz zamjenu  $t = \sqrt{x}$  slijedi:

$$\frac{10-t}{t^2-t} \geq 0 \Rightarrow \frac{10-t}{t(t-1)} \geq 0.$$

Dobivenu nejednadžbu riješimo pomoću tablice. Najprije provedemo diskusiju. Pitamo se za koje  $t$  je nazivnik jednak nuli:

$$t \cdot (t-1) = 0 \Rightarrow t = 0 \text{ i } t = 1.$$

Te rezultate moramo izbaciti iz skupa rješenja. Sada rješavamo nejednadžbu:

$$(10-t) \cdot t \cdot (t-1) \geq 0.$$

Nađemo karakteristične točke tako da svaki faktor izjednačimo s nulom:

$$10-t=0, \quad t=0, \quad t-1=0 \Rightarrow t=10, \quad t=0, \quad t=1.$$

Karakteristične točke su: 0, 1 i 10. Napravimo tablicu!

	$-\infty$	0	1	10	$+\infty$
$10-t$	+	+	+	-	
$t$	-	○	+	+	+
$t-1$	-	-	○	+	+
<b>Produkt</b>	+	-	+	-	

Rješenje nejednadžbe je:

$$t \in (-\infty, 0) \cup (1, 10]$$

ili napisano pomoću znakova nejednakosti:

$$t < 0 \text{ i } 1 < t \leq 10.$$

Zbog supstitucije  $t = \sqrt{x}$  slijedi:

$$\sqrt{x} < 0, \text{ nema smisla,}$$

$$1 < \sqrt{x} \leq 10 \Rightarrow 1 < \sqrt{x} \leq 10 \text{ /}^2 \Rightarrow 1 < x \leq 100.$$

Područje definicije je:  $\langle 1, 100 \rangle$ .

### Vježba 015

Odredite područje definicije realne funkcije  $f(x) = \sqrt{\sqrt{x} - 10}$ .

**Rezultat:**  $[100, +\infty)$ .

### Zadatak 016 (Ines, gimnazija)

Odredite kodomenu funkcije  $f(x) = 2x^2 - 3x$ .

### Rješenje 016

Graf kvadratne funkcije  $f(x) = ax^2 + bx + c$  je parabola s tjemenom u točki  $T = (x_0, y_0)$ , gdje su:

$$x_0 = -\frac{b}{2a}, \quad y_0 = \frac{4ac - b^2}{4a}.$$


U točki  $x_0$  funkcija  $f$  poprima najmanju vrijednost ako je  $a > 0$ , a najveću vrijednost ako je  $a < 0$ .

Graf kvadratne funkcije  $f(x) = 2x^2 - 3x$  je parabola  $y = 2x^2 - 3x$ , pri čemu je:

$$a = 2, b = -3, c = 0.$$

Koordinate tjemena su:

$$x_0 = -\frac{-3}{4} = 0.75, \quad y_0 = \frac{-9}{8} = -1.125.$$



Skup vrijednosti funkcije (kodomena) je projekcija grafa funkcije na os ordinata.

Kodomena zadane funkcije je:  $[-1.125, +\infty)$ .

### Vježba 016

Odredite kodomenu funkcije  $f(x) = 2x^2$ .

**Rezultat:**  $[0, +\infty)$ .

### Zadatak 017 (Ines, Petra, gimnazija)

Odredite inverznu funkciju funkcije  $f(x) = \frac{1}{6} \cdot \log(100x^{-2}) + 1$ .

### Rješenje 017

1. inačica

$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{6} \cdot \log(100x^{-2}) + 1 \Rightarrow y - 1 = \frac{1}{6} \cdot \log(100x^{-2}) \text{ /} \cdot 6 \Rightarrow \\ &\Rightarrow 6y - 6 = \log(100x^{-2}) \Rightarrow [\log_b a = c \Leftrightarrow b^c = a] \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 10^{6y-6} = 100x^{-2} \text{ /:100} \Rightarrow \frac{10^{6y-6}}{100} = x^{-2} \Rightarrow \frac{10^{6y-6}}{100} = \frac{1}{x^2} \Rightarrow x^2 = \frac{100}{10^{6y-6}} \Rightarrow x^2 = \frac{10^2}{10^{6y-6}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x^2 = 10^{2-6y+6} \Rightarrow x^2 = 10^{8-6y} \quad / \sqrt{\phantom{x}} \Rightarrow x = 10^{4-3y} \Rightarrow f^{-1}(x) = 10^{4-3x}.$$

2. inačica

$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{6} \cdot \log(100x^{-2}) + 1 \Rightarrow y - 1 = \frac{1}{6} \cdot \log(100x^{-2}) \quad / \cdot 6 \Rightarrow 6y - 6 = \log(100x^{-2}) \Rightarrow \\ &\Rightarrow [\log(x \cdot y) = \log x + \log y, \log x^n = n \cdot \log x] \Rightarrow 6y - 6 = \log 100 + \log x^{-2} \Rightarrow \\ &\Rightarrow 6y - 6 = 2 - 2 \cdot \log x \Rightarrow 2 \cdot \log x = 2 - 6y + 6 \Rightarrow 2 \cdot \log x = 8 - 6y \quad / :2 \Rightarrow \\ &\Rightarrow \log x = 4 - 3y \Rightarrow x = 10^{4-3y} \Rightarrow f^{-1}(x) = 10^{4-3x}. \end{aligned}$$

### Vježba 017


Odredite inverznu funkciju funkcije  $f(x) = \frac{1}{6} \cdot \log(100x^{-2}) - 1$ .

**Rezultat:**  $f^{-1}(x) = 10^{-2-3x}$ .

### Zadatak 018 (1A, hotelijerska škola)

Za koju vrijednost argumenta (varijable) x funkcija prikazana na slici prima vrijednost y = -1?

### Rješenje 018




Kroz točku (0, -1) na y osi povučemo usporednicu (paralelu) s apscisom (x – osi). Sjecište usporednice i zadanog pravca je tražena točka A. Iz nje konstruiramo okomicu na apscisu i pročitamo apscisu x = 3. Dakle, funkcija prikazana na slici prima vrijednost y = -1 za x = 3.

### Vježba 018

Kolika je vrijednost funkcije prikazane na slici za x = 3?

**Rezultat:**



Kroz točku (3, 0) na x – osi povučemo okomicu na apscisu. Sjecište okomice i zadanog pravca je tražena točka A. Iz nje konstruiramo okomicu na ordinatnu os y i pročitamo ordinatu y = -1.

Dakle, funkcija prikazana na slici za x = 3 ima vrijednost y = -1.

**Zadatak 019 (Marinko, tehnička škola)**

Provjeri je li funkcija  $f(x) = \log \frac{x+1}{x-1}$  injekcija.

**Rješenje 019**

Kažemo da funkcija f ima svojstvo injektivnosti ili da je ona injekcija ako vrijedi

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2).$$

Dakle, funkcija je injekcija ako različitim brojevima pridružuje različite vrijednosti funkcije. Svojstvo ekvivalentno ovome je:

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2.$$

Dakle, funkcija je injekcija ako iz jednakosti funkcijskih vrijednosti slijedi i jednakost argumenata.

Prepostavimo da je  $f(x) = f(y)$ :

$$\begin{aligned} f(x) = f(y) &\Rightarrow \log \frac{x+1}{x-1} = \log \frac{y+1}{y-1} \Rightarrow \left[ \begin{array}{l} \text{logaritamska funkcija je injektivna} \\ \log x = \log y \Rightarrow x = y \end{array} \right] \Rightarrow \frac{x+1}{x-1} = \frac{y+1}{y-1} \Rightarrow \\ &\Rightarrow [ \text{pomnožimo ukriž} ] \Rightarrow (x+1) \cdot (y-1) = (x-1) \cdot (y+1) \Rightarrow xy - x + y - 1 = xy + x - y - 1 \Rightarrow \\ &\Rightarrow xy - x + y - 1 = xy + x - y - 1 \Rightarrow -x + y = x - y \Rightarrow 2y = 2x /:2 \Rightarrow x = y. \end{aligned}$$

**Vježba 019**

Provjeri je li funkcija  $f(x) = \log(2x+6)$  injekcija.

**Rezultat:** Funkcija je injekcija.

**Zadatak 020 (Anastazija, gimnazija)**

Provjeri je li funkcija  $f(x) = \sqrt{16 - x^2}$  injekcija.

**Rješenje 020**

Kažemo da funkcija f ima svojstvo injektivnosti ili da je ona injekcija ako vrijedi

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2).$$

Dakle, funkcija je injekcija ako različitim brojevima pridružuje različite vrijednosti funkcije. Svojstvo ekvivalentno ovome je:

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2.$$

Dakle, funkcija je injekcija ako iz jednakosti funkcijskih vrijednosti slijedi i jednakost argumenata.

Prepostavimo da je  $f(x) = f(y)$ :

$$f(x) = f(y) \Rightarrow \sqrt{16 - x^2} = \sqrt{16 - y^2} / 2 \Rightarrow 16 - x^2 = 16 - y^2 \Rightarrow x^2 = y^2.$$

Odavde ne slijedi nužno da je  $x = y$ , jer može biti i  $x = -y$ . Zaista, za  $x = -3$  i  $y = 3$  vrijedi:

$$\left. \begin{aligned} f(-3) &= \sqrt{16 - (-3)^2} = \sqrt{7} \\ f(3) &= \sqrt{16 - 3^2} = \sqrt{7} \end{aligned} \right\}.$$

Prema tome, pronašli smo točke  $x \neq y$  za koje vrijedi  $f(x) = f(y)$  pa funkcija nije injektivna.

**Vježba 020**

Provjeri je li funkcija  $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$  injekcija.

**Rezultat:** Funkcija nije injekcija.