

Str.61 Naloge 19 a), 23 a) 25 a) 39 a)

Reši enačbe:

$$19 \text{ a)} \frac{\log(x^2 + 2x + 1)}{\log(5x + 1)} = 1$$

$$23 \text{ a)} \log^2 x - \log x^2 - 3 = 1$$

$$25 \text{ a)} \frac{2}{\log x} + \frac{1}{5 - \log x} - 1 = 0$$

$$39 \text{ a)} \log_3 x + \log_9 x + \log_{27} x = 11$$

Glej tudi naloge na strani 59 (3 a) – 3 h) in strani 61 (13 a) – 13 č)

Rešiti moramo enačbe, pri katerih velja:

$$(1) a^y = x \Leftrightarrow y = \log_a x, \quad x > 0, \quad a > 0, \quad a \neq 1$$

$$(2) \log_a 1 = 0$$

$$(3) \log_a a = 1$$

$$(4) \log_a(x + y) = \log_a x + \log_a y$$

$$(5) \log_a x^n = n \log_a x$$

$$(6) \log_a \left(\frac{x}{y} \right) = \log_a x - \log_a y$$

$$(7) \log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

$$(8) \log_{10} x = \log x$$

$$(9) \log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

To je formula za spremembo osnove, kjer je a stara osnova in b nova osnova.

Rešitev

$$19 \text{ a)} \frac{\log(x^2 + 2x + 1)}{\log(5x + 1)} = 1 \quad / \cdot \log(5x + 1)$$

$$\log(x^2 + 2x + 1) = \log(5x + 1) / \text{anti log}$$

$$x^2 + 2x + 1 = 5x + 1$$

$$x^2 - 3x = 0$$

$$x(x - 3) = 0$$

$$\underline{x_1 = 0} \quad x - 3 = 0$$

$$\underline{\text{ne ustreza}} \quad \underline{x = 3}$$

Pogoj:
 $\log(5x + 1) \neq 0$

Preizkus rešitve:

$x_1 = 0$ Tako vidim, da je $\log(5x+1) = \log 1 = 0$, kar pa pogoj ne dovoljuje. Zato $x_1 = 0$ ni rešitev in k rešitvi zapišemo: ne ustreza

$$x = 3$$

$$\frac{\log(9+6+1)}{\log(15+1)}$$

Tu že vidim, da je argument pod obema logaritmoma pozitiven, zato ta rešitev ustreza. To tudi dopišem v rešitev. Vedeti moram, da to ni preizkus enačbe. Lahko ga narediš za vajo.

23 a) $\log^2 x - \log x^2 - 3 = 1$
 $(\log x)^2 - 2\log x - 3 = 0$

$$\begin{aligned} t^2 - 2t - 3 &= 0 \\ (t-3)(t+1) &= 0 \\ t_1 &= 3 \quad t_2 = -1 \end{aligned}$$

Vedeti moram za dogovor, da velja $\log^2 x = (\log x)^2 = \log x \cdot \log x$. Po (5) iz teorije poenostavim enačbo ter vpeljem novo neznanko:

$$\begin{array}{ccc} \log x = t & & \\ \log x = 3 & \leftarrow & \log x = -1 \\ 10^3 = x & & 10^{-1} = x \\ \hline x_1 = 1000 & & x_2 = \frac{1}{10} \\ (\text{ustreza}) & & (\text{ustreza}) \end{array}$$

Po preizkusu rešitve vidim, da sta obe ustrezeni, saj sta obe pozitivni, kar zadostuje za $\log x$, kjer mora biti $x > 0$.

25 a) $\frac{2}{\log x} + \frac{1}{5 - \log x} - 1 = 0$

$$\frac{2}{1+t} + \frac{1}{5-t} - 1 = 0 / (1+t)(5-t) \quad (*)$$

$$\begin{aligned} 1+t &\neq 0 \\ t &\neq -1 \\ \hline 5-t &\neq 0 \\ t &\neq 5 \\ 2(5-t) + 1+t - (1+t)(5-t) &= 0 \\ 10 - 2t + 1 + t - (5-t + 5t - t^2) &= 0 \\ 11 - t - 5 - 4t + t^2 &= 0 \\ t^2 - 5t + 6 &= 0 \\ (t-2)(t-3) &= 0 \end{aligned}$$

Vpeljem novo neznanko $\log x = t$. Vidim, da bodo vsi x-i, ki so pozitivni ustrezne rešitve. Vendar skozi racionalno enačbo (*) s t-jem dobim nova dodatna pogoja: $t \neq -1$ in $t \neq 5$.

$t_1 = 2 \qquad \qquad t_2 = 3$ $\log x = t$ $\leftarrow \qquad \rightarrow$ $\log x = 2 \qquad \qquad \log x = 3$ $10^2 = x \qquad \qquad 10^3 = x$ $\frac{x_1 = 100}{\text{ustreza}} \qquad \qquad \frac{x_2 = 1000}{\text{ustreza}}$	<p>Vidim, da ni nobeden od t – jev prepovedan, zato sta oba t – ja ustrezna za rešitev racionalne (*). Vstavim jo v $\log x = t$ in izračunam oba x – a.</p> <p>Obe rešitvi sta pozitivni in tako k obema napišem: ustreza.</p>
<p>39 a) $\log_3 x + \log_9 x + \log_{27} x = 11$</p> $\log_9 x = \frac{\log_3 x}{\log_3 9} = \frac{\log_3 x}{\log_3 3^2} = \frac{\log_3 x}{2}$ <p style="text-align: center;">po (5) in (3)</p> $\log_{27} x = \frac{\log_3 x}{\log_3 27} = \frac{\log_3 x}{\log_3 3^3} = \frac{\log_3 x}{3}$ $\log_3 x + \frac{\log_3 x}{2} + \frac{\log_3 x}{3} = 11$ $t + \frac{t}{2} + \frac{t}{3} = 11/.6$ $6t + 3t + 2t = 66$ $11t = 66$ $\underline{t = 6}$	<p>Tu uporabim (9) ter vse logaritme spravim na isto osnovo – najlaže je na najmanjšo osnovo v nalogi. To je 3.</p> <p>Vstavim v enačbo ter jo rešim. Ugodno je vpeljati novo neznanko, ni pa nujno.</p> $\log_3 x = t$ $\log_3 x = 6$ $3^6 = x$ $\underline{x = 129}$